

EC FERTİLİZER
KALSİYUM KLORÜR ÇÖZELTİSİ
CMI GOLDEN CaB

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO)
Suda Çözünür Bor (B)

W / W
% 12,5
% 1,0



ÜRETİCİ FIRMA:

CMI LIMITED

The Studio Main Street South Scarle Newark
Notts NG23 7JH UK. 006

İTHALATÇI FIRMA:

AMARKO TARIM TİC. VE PAZ. LTD. ŞTİ.

Cemalpaşa Mah. Fuzuli Cad. Galeria İş Merkezi 14
1047 Seyhan/ADANA
Tel: 0322 456 09 02 Fax: 456 09 04

UYARILAR:

- *Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
- *Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- *Gübreleme esnasında maske, eldiven ve gözlük kullanınız.
- *Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayıp imha ediniz.
- ***Toprak ve / veya yaprak analizi yaptırılarak ürünün kullanılması tavsiye edilir.**

DEPOLAMA ŞARTLARI:

Orijinal ambalajında normal şartlar altında (serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal şartlarda en az 3 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder.

Depolama sıcaklığı 0 ila 25 °C arasında olmalıdır.

Bakanlık Tescil No:

İmal Tarihi:

Bakanlık Lisans No: 125

Son Kullanma Tarihi: Üretim Tarihinden İtibaren 3 Yıldır.

Net Ağırlık:

Şarj No:

Hacim:

KULLANIM TALİMATLARI:

BİTKİ	UYGULAMA ZAMANI	UYGULAMA SAYISI	DOZU
SEBZELER	Şaşırtmadan hemen sonra ilk uygulama 20 gün ara ile diğer uygulamalar	4	250 ml / 100 lt su (Yapraktan)
ÇİLEK	Şaşırtmadan hemen sonra ilk uygulama 20 gün ara ile diğer uygulamalar	2	300 ml / 100 lt su (Yapraktan)
NARENÇİYE	Çiçek öncesi ilk uygulama 30 gün ara ile diğer uygulamalar	3	250 ml / 100 lt su (Yapraktan)
MEYVE AĞAÇLARI	Döl tutumundan hemen sonra ilk 30 gün ara ile diğer uygulamalar	3	250 ml / 100 lt su (Yapraktan)
ZEYTİN	Çiçek öncesi ilk uygulama 30 gün ara ile diğer uygulamalar	2	200 ml / 100 lt su (Yapraktan)
BAĞ	Koruk döneminde ilk uygulama 25 gün sonra ikinci uygulama	2	250 ml / dekara (Yapraktan)
ŞEKER PANCARI	Bitkiler 20-25 cm boya erişince ilk 30 gün sonra ikinci uygulama yapılır	2	250 ml / dekara (Yapraktan)
KAVUN, KARPUZ	Fidele tarlaya şaşırtıldıktan 5-6 gün sonra veya tohumdan ekimde, Bitkiler 4-5 yaprak olduğunda 1. Uygulama bundan 15-20 gün aralıklarla 2. ve 3. uygulama yapılır.	3	250 ml / 100 lt su (Yapraktan)
PAMUK	Tarak öncesi ilk uygulama elma döneminde ikinci uygulama yapılır.	2	250 ml / dekara (Yapraktan)
YER FISTIĞI	Ekimden 30 gün sonra ilk uygulama ilk uygulamadan 20 gün sonra ikinci uygulama yapılır.	2	250 ml / dekara (Yapraktan)

Piyasaya sunacağımız etiket i e aynısı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 7223 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri kabul ederiz.

AMARKO TARIM TİC. VE PAZ. LTD. ŞTİ.

Cemalpaşa Mah. Fuzuli Cad. Galeria İş Merkezi 14
1047 Seyhan/ADANA

Tel: 0322 456 09 02 Fax: 456 09 04