

İMAL TARİHİ:  
SON KULLANMA TARİHİ:  
ŞARJ NUMARASI  
RUHSAT TARİHİ VE NUMARASI: 11143 / 01.06.2018

**KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:**

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu	Son Uygulama ile Hasat Arasında Kalan Süre
*Bağ	Mildiyö ( <i>Plasmopara viticola</i> )	50 ml/100 l su	7 gün
Domates	Mildiyö ( <i>Phytophthora infestans</i> )	150 ml/100 l su	7 gün
Armut	Karaleke ( <i>Venturia pirina</i> )	125 ml/100 l su	21 gün
Elma	Karaleke ( <i>Venturia inaequalis</i> )	125 ml/100 l su	21 gün
Zeytin	Halkalı Leke ( <i>Spilocaea oleagina</i> )	125 ml/100 l su	14 gün
Turungiller	Kahverengi leke ( <i>Alternaria alternata f.sp. citri</i> )	250 ml/100 l su	14 gün

(\* ) Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.

**BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:**

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptaki miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama Tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılır.

**KALİBRASYON:**

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

**İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:**

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapılmamalıdır. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmamızdır.

**BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:**

**Bağ Mildiyö**

1.Uygulama: Sürgün boyu 25-30 cm uzunlukta olunca uygulanmalıdır.  
2. Ve Diğer Uygulamalar: İlk uygulamadan 15 gün sonra yapılmalıdır. Bölgenin günlük sıcaklık ve yağış ortalamaları, nispi nem, çiğ gibi meteorolojik faktörler dikkate alınarak hastalık enfeksiyonu için uygun koşullar oluştuğunda uygulamalar yapılmalı, koşullar ortadan kalktığında uygulamalara son verilmelidir.

**Domates Mildiyö:** Çevrede domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin alt yüzünde beyaz kül gibi konidi örtüsünün görülmesi ile uygulamaya başlanır.



ERTAR KİMYA  
Tarım Ürünleri ve Aletleri İmalat  
Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şti.

**CUBOX SC**

SÜSPANSİYON KONSANTRE (SC)

GRUP	M:1	FUNGİSİT (Mantar İlacı)
------	-----	-------------------------

65,82 g/l Metalik Bakıra Eşdeğer Bakır Sülfat

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**

Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine ¼'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu uygulama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.

**ZEHİRLENME BELİRTİLERİ**

Yutulduğunda bulantı, kusma, baş ağrısı, mide ağrısı, tahrişe neden olur.

**İLK YARDIM ÖNLEMLERİ**

**Deri ile teması halinde:** Kızarıklık, kabarma, kaşınma, sulanma ve acı gibi semptomlar ile cilt tahrişine neden olur. Kirlenmiş giysileri çıkarınız ve derhal nötral sabun ve su ile yıkayınız. Tıbbi yardım alınınız.

**Göz ile teması halinde:** Kızarıklık, kabarma, kaşınma, sulanma ve acı gibi semptom ile göz tahrişine neden olur. Gözle temasında, en az 15 dakika boyunca düşük basınçlı ile gözleri yıkayınız. Tıbbi yardım alınınız.

**Solunması halinde:** Burun akıntısı, boğaz ağrısı, sık nefes ve öksürme gibi semptomlar oluşabilir. Yeterli miktarın solunması ve absorbe olması durumunda, akut yutulma durumunda oluşan semptomlara benzer semptomlar oluşabilir. Temiz hava sağlayınız. Tıbbi yardım alınınız, etiketi doktora gösteriniz.

**Yutulması halinde:** İshal, kusma, mide bulantısı ve karın ağrısı ile birlikte bağırsak iltihabına neden olabilir. Kulak çınlaması, baş dönmesi, tansiyon artışı, görüş ve titreme gibi sistemik etkilerle takip edebilir. Hastaya 200 ml-400 iril su ve derhal tıbbi yardım alınınız.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) TEL:114



NET MİKTARI:  
AZAMI PERAKENDE SATIŞ FİYATI:

**İÇİNDEKİLER**

1. Bakır sülfat penta hidrat
2. Ethanol
3. Mono propylenglycol
4. Sodiumdodecyl benzene sulfonate
5. Foamaster S 15

**ZARARLILIK İŞARETLERİ**



**UYARI KELİMESİ: TEHLİKE**

**ZARARLILIK İFADELERİ(H)**

- H302:** Yutulması halinde zararlıdır.  
**H312:** Cilt ile teması halinde zararlıdır.  
**H315:** Cilt tahrişine yol açar.  
**H318:** Ciddi göz hasarına yol açar.  
**H319:** Ciddi göz tahrişine yol açar.  
**H351:** Kansere yol açma şüphesi var.  
**H400:** Sucul ortamda çok toksiktir.  
**H410:** Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.  
**EUH401:** İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

**ÖNLEM İFADELERİ (P)**

- P201:** Kullanmadan önce özel talimatları okuyun.  
**P202:** Bütün önlem ifadeleri okunup anlaşılmadan elleçlemeyin.  
**P273:** Çevreye verilmesinden kaçınınız.  
**P280:** Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/üzü koruyucu kullanınız.  
**P312:** Kendinizi iyi hissetmezseniz, ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru/hekimi arayınız.  
**P362:** Kirlenmiş giysilerinizi çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayınız.  
**P391:** Döküntüleri toplayınız.  
**P405:** Kilit altında saklayınız.  
**P501:** İçeriği/kabı yerel yönetmeliklere uygun olarak bertaraf ediniz.

**ertar kimya**  
Tarım Ürünleri ve Aletleri İmalat  
Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şti.  
Acıdereosb Mah. Zafer Cad. No : 8  
Sarıçam /ADANA Tel.: 456 19 44 Fax: 456 19 47  
Yürürlük V.D: 372 036 2756

Şirket Vekili  
**Burak Kişin**

01 Haziran 2018  
GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI  
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR



#### Armut karalesesi:

- 1.uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)
- 2.uygulama: Beyaz rozet döneminde
- 3.uygulama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce
4. ve diğer uygulamalar: İklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 10 gün arayla yapılmalıdır.

#### Elma karalesesi:

- 1.uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)
- 2.uygulama: Pembe rozet tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde)
- 3.uygulama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce
4. ve diğer uygulamalar ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 15 gün arayla yapılmalıdır.

#### Zeytinlerde halkalı leke:

Marmara Bölgesinde:

- 1.uygulama: Sonbahar sürgünleri görülmeden hemen önce,
  - 2.uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce,
- Ege Bölgesinde:

- 1.uygulama: İlbahar sürgünleri görülmeden hemen önce,
  - 2.uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açılmadan önce,
- Akdeniz Bölgesinde:

- 1.uygulama: Hasattan sonra,
- 2.uygulama: İlbahar sürgünleri görülmeden hemen önce,
- 3.uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce, yapılmalıdır.

#### Turunçgilde kahverengi leke:

Uygulamalara, sürgün gelişimi ve iklim özellikleri dikkate alınarak sürgünler gelişmeye başladığında yaklaşık 5-10 cm uzunlukta olduğunda ve ilk hastalık belirtileri görüldüğünde başlanır.

Özellikle sürgün gelişmesi döneminde büyüyen sürgün ve yaprakların yeni oluşan kısımlarının ve genç meyvenin hastalıktan korunması amacıyla 15-20 gün aralıklarla uygulamalara devam edilir.

Uygulamalara sürgün gelişmesinin durduğu, yağışların azaldığı ve sıcaklıkların arttığı ve meyvenin yaklaşık 4 cm çapa ulaştığı zaman son verilir.

#### DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

**CUBOX SC** isimli bitki koruma ürünü etki mekanizmasına göre Grup M: 1 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için **CUBOX SC**'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayın. Uygulamanın tekrarlanması gereken durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup M: 1 harici) fungisitlerin kullanılmasına özen gösteriniz.

#### KARIŞABİLİRLİK DURUMU

**CUBOX SC**, yüksek alkali reaksiyonlu pestisitlerle, chlorpyriphos ve dichloran ile karıştırmayınız.



ERTAR KİMYA

Tarım Ürünleri ve Aletleri İmalat  
Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şti.

## CUBOX SC

SÜSPANSİYON KONSANTRE (SC)

GRUP	M:1	FUNGİSİT (Mantar İlacı)
------	-----	----------------------------

65,82 g/l Metalik Bakıra Eşdeğer Bakır Sülfat

#### ANTİDÖTÜ ve TEDAVİSİ

Özel bir antidotu yoktur. Gerektiğinde belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) TEL:114

#### KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme dönemi kullanmayınız.
- Balıklara zehirlidir, yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
- Boş bitki koruma ürünü ambalajlarını usulüne uygun imha ediniz, boşalan ambalajları başka amaçlar için kesinlikle kullanmayınız.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.

#### DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgör (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

#### FİRMA BEYANI

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ürünlerinin hatalı depolanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

#### RUHSAT SAHİBİ ve ÜRETİCİ FİRMA

ERTAR KİMYA Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.  
Acıdere Osb Mah. Zafer Cad. No: 8 Sarıçam/ADANA  
Tel: 0 (322) 4561945 Faks:0 (322) 4561947  
info@ertarkimya.com.tr www.ertarkimya.com.tr

01 Haziran 2018

GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI  
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR

*Y. Bayram*  
Dr. Yunus BAYRAM  
Genel Müdür Yardımcısı V.

**ertar kimya**  
Tarım Ürünleri ve Aletleri İmalat  
Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.  
Acıdere Osb Mah. Zafer Cad. No : 8  
Sarıçam/ADANA Tel.: 456 19 44 Fax : 456 19 47  
Yüreğir V.D: 372 036 2756

Şirket Vekili  
Burak KİŞİN