

İmal Tarihi:  
Son Kullanma Tarihi:  
Şarj Numarası:  
Ruhsat Tarihi ve Numarası: 29.08.2008 / 6495



ERTAR KİMYA  
Tarım Ürünleri ve Aletleri İmalat  
Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

## MASSGİBB

SUDA ÇÖZÜNEN KONSANTRE (SL)

GRUP	-	BİTKİ GELİŞİM DÜZENLEYİCİ
------	---	---------------------------

20 g/l Gibberellic acid

- ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
- EVDE KULLANMAYINIZ.
- ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA ÜRÜN BİTKİ ÜZERİNDE KURUYUNCAYA KADAR İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
- İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN, TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE VE TAVSİYE EDİLEN DOZDA KULLANINIZ.  
**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**
- KULLANILAN ÜRÜNÜN BOŞ AMBALAJLARININ İÇİNE ¼'ÜNE KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ 3 SEFER TEKRARLAYINIZ.

### ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

### İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

- **Deri ile Teması Halinde;** Bol su ve sabunla yıkanır.
- **Göz ile Teması Halinde;** Derhal en az 15 dakika boyunca göz kapaklarını açık tutarak, göz yıkama solüsyonu veya temiz su ile yıkayınız. Tıbbi destek alın.
- **Yutulması Halinde;** Yutulması halinde doktora başvurunuz ve mümkünse bu bilgi formunu da gösteriniz.
- **Solunması Halinde;** Hastayı maruz kaldığı ortamdaki çıkarın. Tedbir olarak tıbbi yardım alın.

### ANTİDOTU VE TEDAVİSİ

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

Net Miktarı:  
Azami Perakende Satış Fiyatı:

### İÇİNDEKİLER

1. Gibberellic acid
2. 1-Propanol

### ZARARLILIK İŞARETİ



UYARI KELİMESİ: TEHLİKE

### ZARARLILIK İFADELERİ (H)

- H226: Alevlenir sıvı ve buhar.
- H318: Ciddi göz hasarına yol açar.
- H336: Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.

### ÖNLEM İFADELERİ (P)

- P261: Spreyini solumaktan kaçının.
- P273: Çevreye verilmesinden kaçının.
- P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
- P305+P351+P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.
- P501: İçeriği/kabı yerel yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin.
- EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

ertar kimya  
Tarım Ürünleri ve Aletleri İmalat  
Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.  
Acıdereosb Mah. Zaferan Cad. No : 8  
Sarıçam/ANKARA/TÜRKİYE Tel: 312 319 44 Fax: 456 19 47  
Tic. Sic. No: 312 036 2756

Dr. Zeynel AKDAĞCIK  
Ruhsatlandırma Müdürü

### BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILDIĞI BİTKİLER, UYGULAMA AMACI VE DÖNEMLERİ

BİTKİ	UYGULAMA AMACI VE DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU (100 L suya)
Sofralık Çekirdeksiz Üzümler	<b>1.Uygulama:</b> Çiçeklenmeden önce salkımlar henüz 4-8 cm boyunda iken salkımların boyunu uzatmak için kullanılır. <b>2.Uygulama:</b> Tam çiçeklenme döneminde, yani çiçek taç yapraklarının %70-80'i döküldüğü devrede dane seyretmek için kullanılır. <b>3.Uygulama:</b> Çiçeklenmeden sonra daneler 3 mm. saçma iriliğine ulaştığında dane irileştirmek için kullanılır.	100 ml
Kurutmalık Çekirdeksiz Üzümler	Çiçek kapsüllerinin dökülmesinden 4-5 gün sonra verimini artırmak ve hasadı öne almak için kullanılır.	50 ml
Mandarin	Satsuma ve Klemantin çeşitlerinde çiçek dökümünü azaltmak, meyve tutumunu artırmak ve verim artışı sağlamak amacı ile çiçeklerin %75-80'inin açtığı devrede kullanılır.	75 ml
Portakal	Yafa portakallarında haziran dökümünü önlemek için çiçek açımının tamamlanmasından 4-5 hafta sonra kullanılır. Washington Navel'de meyvelerin ağaçta kalma süresini uzatmak ve hasadı düzenlemek için meyvelerde renk değişiminin başladığı devrede kullanılır.	100 ml
Limon	Meyvelerde ilk renk değişimi görüldüğünde, meyvelerin ağaçta 2-3 ay kalmalarını sağlamak için kullanılır.	50 ml
Greyfurt	Meyve kabuğunda çürüme, bozulma ve yumuşama olmadan hasadı geciktirmek amacı ile meyvelerde ilk renk değişiminin görüldüğü devrede kullanılır.	50 ml
Armut	Meyve tutumu az olan armut çeşitlerinde çiçeklerin %30'unun açtığı devrede verimi artırmak için kullanılır. Çiçeklenme zamanında meydana gelen don olaylarından sonra partenokarp meyve oluşumunu sağlamak için kullanılır.	75-100 ml 25-100 ml
Kiraz ve Vişne	Hasadı geciktirmek, iri ve parlak daneler elde etmek amacı ile renk değişiminin başladığı dönemde kullanılır.	75 ml
Şeftali	Ağustos ayının ilk haftasında yapılacak bir uygulama, bir sonraki yılın çiçek açımının 3-7 gün geciktirir ve şeftalilerin ilkbaharın geç donlarından zarar görmesini engeller.	75 ml
Çilek	Fideliklerde anaç bitkinin verdiği genç sürgünlerin çoğalmasını temin etmek için, anaç bitki 1-6 yapraklı iken mahsule yatmasını sağlamak için kullanılır. Meyveleri irileştirmek ve verimi artırmak için ise, çiçeklenmeden 3-4 hafta önce kullanılır.	75-125 ml
Enginar	Hasadı 1-2 ay öne almak, düzgün şekilli ve iri başlı elde etmek amacı ile bitkilerin 4-5 yapraklı boylarının 20-30 cm olduğu devrede özellikle bitkilerin göbek kısmına kullanılır.	125-150 ml
Patates	Tohumluk patatesler dikilmeden önce MASSGİBB ile hazırlanan solüsyona daldırılır ve dikilir. Böylece hızlı ve düzenli çıkış sağlanır.	25-50 ml
Marul	Göbek bağlamayı teşvik için hasattan 7-15 gün önce kullanılır.	50-100 ml
Biber	Verimi artırmak için çiçeklerin yarısı meyve tuttuğunda ve bundan 2-3 hafta sonra kullanılır.	150 ml
Süs bitkileri	Kesme çiçeklerde uzun sap ve iri çiçek elde etmek amacı ile krizantem, gül, siklamen ve karanfile uygulanır.	200-750 ml

23 Şubat 2022

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR.

39

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL:114

Osman ARSLAN  
Daire Başkanı